

# ColiPrev®

## Koliprev

Laktaza fermenti tarkibli  
Biology feallığı malik qida aləvəsi



### KÖRPƏLƏRDƏ SANCILAR

Təxminən körpələrin 20-25 %-i narahatlılıq və qışqırıqla müşayit olunan sancılardan eziyyət çekir. Sancısı olan usaqlar adətən ayaqlarını qarın nahiyyesinə doğru yiğəraq, dayanmadan ağlayırlar. Tebi ki, bir qayda olaraq bütün körpələr ağlayır, lakin əger ağlama gün ərzində 3 saatdan, həftə ərzində isə 3-4 gündən artıq olarsa, bələ körpələrdə sancti olması ehtimalı böyüküdür.

qıçırımeye məruz qalmasına səbəb olur. Neticədə bagırsaqda qaz yığırlar. Bu isə öz növbəsində körpənin qarın nahiyyəsində bərkəşmə ilə müşayit olunan köpün yaranmasına və qarın boşlığında şıxşınlıyın əmələ gelməsinə səbəb olur.

Həddindən artıq fermentativ feallıq bağırsaq peristaltikasında nizamsızlığın yaranmasına və qicolmalarda səbəb olub, tez-tez mədədə səsler eşitmək olar.

Laktaza və süd turşusunun yaratdığı tezyiq reflüksla müşayit olunmaqla, qəbüzlik və diareyanın yaranması ilə neticələrin. Bağırsaqda osmotik tezyiqin artması neticəsində yaranan isə itkiş orqanızın tərəfindən kompensasiya olunmazsa, dehidratasiya ilə neticələne bilər.

Bəzi məhsullar var ki, onların ana tərəfindən qəbulu körpəde sancıların yaranmasına və ya mövcud sancıların keskinleşməsinə səbəb olur. Buna görə də laktasiya dövründə hemin məhsullar qida rasionundan çıxarılmalıdır. Bu məhsullara gül kelemi, brokkoli, brüssel kelemi, xişər, soğan, qırızı biber, kofe və həddindən artıq adıvityarılmış yemeklər aiddir.

Körper sakit və rahat mühitdə yedidirilməlidir. Əgər körpədə sancıların yaranma səbəbli laktozanın kifayət qədər ifraz olunmaması ilə bağlıdır, bu zaman laktaza fermentinin südə istifadəsindən sonra diskomfort hissə aradan qalxır və ya azalır.

Yarımçıq doğulmuş və ya yenidoğulmuş, az çəkili körpələr bu cür sancılardan dəha çox eziyyət çekir və onlarda sancılar daha uzun müddətli olur. Bu hal dəha çox bağırsağın inkişaf seviyyesi və onun mikroflorasından asılıdır.

### COLIPREV® - İN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

•Tərkibcə Aspergillus oryzae göbələyindən alınmış yüksək aktiviliyi malik laktaza fermentidir;

•Aspergillus oryzae davamlı və bioloji aktiv laktaza mənbəyidir;

•Medə turşusunun PH faktoruna davamlıdır;

•PF faktorda keşkin deyisişliklər baş verdiğə belə, ferment xüsusiyyətlərini itirmir;

•Hər yeməye 8 damcı əlavə edilməklə 15 ml məhsuldan təxminen 37 yemək porsiyası hazırlanmaq mümkündür.

Laktaza fermenti südə laktozanın hidrolizi asanlaşdırır. Laktozanın parçalanması üçün lazım olan laktaza fermentinin kifayət qədər ifraz olunmadığı halda ilk 3-4 ayda uşağı hər dəfə yedidirində COLIPREV® istifadə olunmalıdır. Daha sonra onun qəbulu tədricin azaldılmalıdır.

Qida qəbulu zamanı tövsiyə olunan doza əvvələc yartıya qədər azaldılmış, sonra gün ərzində bir dəfə qəbul edilməkə gündəlik qəbul sayı azaldılmış, daha sonra COLIPREV®-in qəbulu tam dayandırılmışdır. Əgər COLIPREV® körpənin qida rasionundan çıxarıldıqdan sonra körpədə diskomfort hissi davam edərsə, yaxud yeniden tekrarlanırsa, istifadə sxemi yeniden tətbiq edilə bilər.

### SANCI OLMASINI TƏSDİQLƏYƏN ƏLAMƏTLƏR

- Sancti 15 gündən 3-4 ay dövründə olan körpələrde müşahidə edilir.
- Körpə adətən, 2-3 saat ərzində dayanmadan ağlayır və onu sakitleşdirmek mümkün olmur.
- Gündən eyni vaxtlarında (adətən günorta və axşamüstü) gündə bir neçə dəfə ağlayır.
- Ayaqlarını qarın nahiyyesinə doğru yiğəraqla bileklərinin sıxırı.
- Tez-tez köp və vaxtaşırı qəbüzlik müşahidə olunur.

### KÖRPƏLƏRDƏ SANCILARIN YARANMASININ ƏSAS SƏBƏBLƏRİ

Sançı ekser hallarda bağırsaq fealiyyətinin tam formalşaması, emizdirme zamanı hava udulması, ananın qəbul etdiyi bəzi qida məhsulları, diskomfort və ya gərginlik səbəbindən baş verir.

### LAKTOZAYA QARŞI DÖZÜMSÜZLÜK

Laktaza -südün körpəsindən və tərkibcə iki molekuldan - qılıcourba və qalaktozadan ibarət şəkərdir. Bu molekulların bağırsaq seviyyəsində absorbsiya olunması (surəmləsi) üçün bağırsaq xoşlarında ifraz olunan laktaza fermentinin təsiri nəticəsində parçalanması (hidrolize uğraması) tələb olunur.

Laktaza fermentinin çatışmazlığı zamanı və ya onun qədər ifraz olunmadığı halda laktaza hidrolizə uğmrıb və neticədə laktozaya qarşı dözümsüzlük yaranır. Bələ hal müvəqqəti karakter daşısa da, tez-tez tasadüf edilir. Körpənin 3-4 ay dövründə sürəlli inkişaf dövrü başlayır və organizmdə kifayət qədər laktaza ifraz olunmaqla, daxil olan laktozanın mənimşənilməsinin yaxşılaşması müşahidə olunur. Körpə doğuldugu andan etibarən ilk həftələrdə laktaza fermentinin normadan az ifrazi laktozanın hezəm olunmamasına və bağırsaq bakteriyalarının təsiri altında

## TƏRKİBİ (1 ml – də):

Təsiridici maddələr (miqdarı göstərilməklə):

Laktaza (Lactase) – ≥3000 ALU

Köməkçi maddələr:

Qliserin (Glycerin), Kalium xlorid (Potassium chloride),  
Kalium sorbat (Potassium sorbate), Təmizlənmiş su  
(Purified water).

## İSTİFADƏ SAHƏSİ VƏ ƏSAS GÖSTƏRİŞLƏR:

Körpələrdə köp sancıları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ

## ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Məhsulun komponentlərinə qarşı fərdi həssaslıq

## İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI

Ana südü ilə:

- evvelcədən sterilizə edilmiş qışığa müvafiq sayıda damcı (dozalar olan cədvələ esasən) əlavə etməkə birləşə usaqın ağızına damızdırılır.
- körpənin emizdirilməsi adı qaydada davam etdirilməlidir.
- Körpələr üçün nezərdə tutulmuş səni qida ilə:
- körpələr üçün qida təlimatda göstərilən qaydada hazırlanmalıdır.
- COLIPREV® cədvəldə göstərildiyi dozalarda iləq süde əlavə edilməlidir.
- istifadə edilmeyən qalıq atılmalıdır.

Əgər körpənin yeməyini evvelcədən hazırlamaq lazımdırsa, bu zaman süde 4 damcı COLIPREV® əlavə etmek və soyuducuda 4 saat ərzində saxlamaq olar.

Aşağıdakı cədvəldə dozalar qeyd edilib.

## QIDA QƏBULU ZAMANI MƏSLƏHƏT GÖRÜLƏN DOZALAR

Yaş həddi	Istifadə südün miqdarı	Damçaların sayı	Laktazanın miqdarı
0-2 həftəlik	60-90 ml	5 damçı	750 ALU*
3-6 həftəlik	120 ml	6 damçı	900 ALU
1 - 2 aylıq	150 ml	8 damçı	1200 ALU
3 - 4 aylıq	180 ml	9 damçı	1350 ALU

\*1 ALU=0,333 µL

## XƏBƏRDARLIQLAR VƏ EHTİYAT TƏDBİR'LƏRİ

COLIPREV® - in tərkibində olan ferment yüksək temperaturun təsirindən parçalanır.

COLIPREV®-i südle qarışdırırcən nəzəre almaq lazımdır ki, süd iləq və ya adı otaq temperaturuna malik olsun (qaynar və ya soyuq olmamalıdır).

İçlik vərəqində qeyd edilən təlimatlara dəqiq riayət edilməlidir.

Əgər körpənin narahatlılığı aradan qalxmazsa, hekimlə məsləhətəşək lazımdır.

Dərman vasitəsi deyildir. Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. Təvsiyə edilən sütaltı dozunu keçməyin. BFMQƏ normal qidalanmayı əvəz etmir. Uşaqların əli çatmayan yerde saxlayın. Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı hekimlə məsləhətəşin.

## BURAXILIŞ FORMASI:

Daxilə qəbul üçün məhlul – damçı, 15 ml plastik flakonda №1, iğlik vərəqe ilə karton qutu qablaşmadı.

## YARARLILIQ MÜDDƏTİ:

2 il

## SAXLANMA ŞƏRAİTİ

25°C –dən yuxarı olmayan temperaturda, quru və qaranlıq yerde saxlamaq lazımdır. Məhsulu orijinal qablaşmadı saxlayın.

Flakon açıldıqdan sonra 3 həftə ərzində istifadə edile bilər. Qablaşma üzərində qeyd edilən yararlılıq müddəti bittikdən sonra məhsul istifadə edilməməlidir.

## İSTEHSALÇI

Lecifarma - Laboratorio Farmaceutico, Lda  
Varzea do Andrade, Cabeço de Montachique, 2670-741  
Lousa, Loures, Portuqaliya

## MARKETİNQ ÜZRƏ SƏLAHİYYƏTLİ SAHİBKAR

NEOSANTÉ® Health Solutions, S.A.  
Rua Dr. Antonio Dias Pinheiro, 370  
2750-294 Cascais, Portuqaliya

