

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

_____ E.M.Ağayev

“ _____ ” _____ 2020-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

ETADOL 5% xaricə istifadə üçün gel
ETADOL

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 q gəlin tərkibində 50 mq etofenamat vardır.

Köməkçi maddələr: karbomer 940, izopropil spirti, etil spirti (96 %), propilenqlikol, trietanolamin, şam ağacı cövhəri, təmizlənmiş su.

Təsviri

Şəffaf, rəngsiz, xarakterik qoxulu gəldir.

Farmakoterapevtik qrupu

Yerli istifadə üçün qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparat.

ATC kodu: M02AA06.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Qana sorulması cüzi olduğundan sistem təsir göstərmir. Etofenamat qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparat olduğundan, ağrıkəsici, qızdırmasalıcı və iltihabəleyhinə təsir göstərir. Ağrının və iltihabın əmələ gəlməsinin patogenezinə təsir göstərir. Revmatik xəstəliklərdə iltihabəleyhinə və analgetik təsiri ağrının azalmasına, oynaqlarda şişlərin azalmasına gətirib çıxarır ki, bu da xəstələrin funksional vəziyyətini yaxşılaşdırır. Dəri üzərində 5-10%-li qatılıqda istifadəsi zamanı əzələ, oynaq və yumşaq toxumalarda travma və iltihab zamanı ağrıları azaldır. İstifadənin əvvəlində sərinləşdirici effekt verir. İstifadəsi dəridə qızarma və ya yandırma hissi yaratmır.

Farmakokinetikası

Siklooksigenazanı inhibə edir, araxidon turşusundan prostaqlandinlərin sintezini tormozlayır. Dəridən qismən sorulur. Qanda zülallarla 98-99% birləşir. Preparatın biomənimsənilməsi 20%-ə çatır. Böyrək çatışmazlığı plazmadakı qatılığına təsir etmir.

Lipofil xassəyə malik olduğundan 20% preparat dəridən sorulmaqla, iltihab sahəsində yük-sək effektli göstərir. İltihablı sahədə preparatın miqdarı iltihab olmayan sahədəkindən 5-20 dəfə çox olur.

Dəriyə və eyni dozada oral qəbulu müqayisə olunduqda, dəridəki iltihab sahəsində etofenamatın miqdarı, yerli istifadə zamanı oral yolla qəbul edildiyindən 27,5 dəfə çox olur. Buna baxmayaraq preparat kumuylasiya olunmur.

Yerli istifadə zamanı qan plazmasında preparatın bioloji yarımparçalanma dövrü 3,3 saatdır. Buna baxmayaraq, etofenamat uzun müddət iltihab nahiyyəsində müəyyən edilir. İstifadədən sonra dəridə etofenamat əsasən dəyişilməmiş (94%-ə qədər) formada, digər hidroliz məhsulları və metabolitlər şəklində tapılır.

İstifadəsinə göstərişlər

Aşağıdakı hallarda yaranan ağrının xarici simptomatik müalicəsi:

- İdman travması kimi küt travmalardan sonra oynaqlarda kəskin əzilmə, burxulma və digər ağrılı vəziyyət.
- Qonartroz zamanı oynaqətrafi yumşaq toxumada (bursa, vətərlər, bağlar və oynaq kapsulu) olan ağrılı vəziyyət.

Əks göstərişlər

- Preparatın təsiredici maddəsinə (etofenamata) və ya köməkçi maddələrindən hər hansı birinə və ya digər QSİÖP-rə qarşı yüksək həssaslıq.
- Anamnezdə asetilsalisil turşusu və digər QSİÖP –in qəbulundan sonra yüksək həssaslıq reaksiyalar 9astma, bronxospazm, rinit, angioödem və ya övrə).
- Tətbiq ediləcək dəri nahiyəsində ekzema, açıq yara, iltihab, infeksiya varsa.
- Dodaqlara,burunun, gözlərin və s. selikli qişalarına istifadə
- Hamiləliyin son 3 ayı.
- 18 yaşa qədər uşaqlar.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Etadol gel aşağıdakı hallarda müəyyən xüsusi ehtiyat tədbirləri ilə və yalnız tibbi nəzarət altında təyin olunmalıdır:

- Astma, tənəffüs yollarının xroniki obstruktiv xəstəlikləri, pollinoz və ya burunun selikli qişasının xroniki ödem, pollinoza bənzər klinik sindromları ilə müşayiət olunan tənəffüs yollarının xroniki obstruktiv xəstəlikləri və ya tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərindən əziyyət çəkən pasiyentlərdə.
 - Digər qeyri-steroid iltihabəleyhinə/analgetik vasitələrə qarşı yüksək həssaslıq olan pasiyentlərdə. Bu pasiyentlərdə Etadol gel üçün risk astma tutmalarına bənzər simptomlar (analgetiklərə dözümsüzlük/analgetik astma), dərinin və selikli qişaların lokal ödem və ya övrə olan pasiyentlərə nisbətən daha yüksəkdir.
 - Digər vasitələrə qarşı dəri reaksiyaları, dəri səpgisi və ya övrə kimi allergik reaksiyaları olan pasiyentlər. Etadol gel gözə düşməməlidir. Təsadüfən gözə təmas edərsə gözü bol su ilə yumaq lazımdır.
- Etadol Gel cilalanmış mebel və ya plastik səthlərdə zədələnmə və ya dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Buna görə də məhsulu istifadə etdikdən sonra əlləri yumaq və ya yuxarıdakı əşyalarla təmasdan qacınmaq lazımdır. Propilenqlikola görə dəri qıcıqlanmasına səbəb ola bilər.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Müəyyən edilməmişdir.

Əgər resept əsasında və ya reseptsiz buraxılan hər hansı bir dərman istifadə edirsinizsə və ya son zamanlarda istifadə etmişinizsə, lütfən həkiminizə və ya əczaçıya bu barədə məlumat verin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövründə və hamiləlik planlaşdıran qadınlarda preparatın istifadəsi məsləhət görülmür. İstifadəsinə ehtiyac olduqda, aşağı dozalarda və qısa müddət ərzində istifadə olunmalıdır.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Məlum deyil.

İstifadə qaydası və dozası

Həkiminiz tərəfindən başqa doza tövsiyə edilməzsə, aşağıdakı təlimatlara riayət edin.

Etadol 5% gel gündə iki-üç dəfə istifadə edilməlidir. Ağrılı nahiyənin sahəsinə görə, təxminən 5- 10 sm uzunluğunda gel (təxminən 3 q gel-ə və 150 mq etofenamata bərabər) tətbiq etməyiniz kifayət edəcəkdir. İdman travmalarında Etadol 5% gel-in gündəlik maksimum dozası, 450 mq etofenamata bərabər olan 9 q geldir.

Dəri geldən su ilə yuyulduqda və ya spirtlə silindikdə təmizlənilir. Preparat dəriyə sürtüldükdə əvvəlcə soyuqluq hissi verir. İdman travmalarında preparatla 1 həftəlik müalicə çox vaxt yetərli olur. Revmatik xəstəliklərdə preparatla müalicə bir necə gündən 3-4 həftəyə qədər davam etdirilə bilər, amma bunu həkiminiz təyin edəcək.

Yaşlılarda istifadəsi

Dozaya düzəliş edilməsinə ehtiyac yoxdur.

Xüsusi istifadə halları

Böyrək/Qaraciyər çatışmazlığı zamanı istifadəsi

Dozaya düzəliş edilməsinə ehtiyac yoxdur.

Əlavə təsirləri

Arzuolunmayan təsirlərin başvermə tezliyi aşağıdakı kimi ifadə olunur.

Çox tez-tez ($\geq 1/10$); tez-tez ($\geq 1/100$ ilə $< 1/10$); bəzən ($\geq 1/1000$ ilə $< 1/100$); nadir ($\geq 1/10.000$ ilə $< 1/1000$); çox nadir ($< 1/10.000$); məlum deyil (mövcud məlumatlara əsasən başvermə tezliyini müəyyən etmək mümkün olmur)

Etadol 5%-li gel, geniş dəri səthi nahiyəsinə və uzun müddət istifadə edilərsə, etofenamattan ibarət olan dərmanların sistem istifadəsindən sonra spesifik orqan sistemlərinə və ya bütün bədənə təsir edən əlavə təsirlərin yaranması mümkündür.

Bəzən: dəridə qızartı, qaşınma, yanma hissi, dəridə səpgilər, bəzən qabarcıqlar və ya övrə kimi lokal dəri reaksiyaları

Nadir: həddindən artıq həssaslıq, dəri reaksiyaları və ya yerli allergik reaksiyalar (kontakt dermatiti)

Bu dərmandan istifadə etməyi dayandırdıqda, dəri reaksiyaları sürətlə aradan qalxacaqdır. Buna görə də, başqa bir spesifik tədbirə ehtiyac yoxdur.

Əgər bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı bir əlavə təsirlə qarşılaşırsanız həkiminizə və ya əczaçıya bu barədə məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Simptomları: baş ağrısı, başgicəllənmə.

Müalicəsi: geli dəri nahiyəsindən dərhal yumaq lazımdır.

Buraxılış forması

40 q gel, tubda. 1 tub, içlik vərəqəsi ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən aşağı otaq temperaturunda, öz qutusunda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mahallesi, Fatih Bulvarı, No: 38

Kapaklı/TEKİRDAĞ/TURKEY.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Söğütüzü Mahallesi 2177. Cadde No: 10 B/49 Çankaya/Ankara, Türkiye.