



TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M.Ağayev

18 fevral 2025-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

AKTİVOGEN inyeksiya üçün məhlul
ACTIVOGEN

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Deproteinized calf blood extractives

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 ampulda (5 ml) quru kütlə hesabı ilə 200 mq deproteinləşdirilmiş buzov qanı ekstraktı vardır.

Köməkçi maddələr: inyeksiya üçün su, polisorbət 80, natrium hidroksid.

Təsviri

Sarımtıl şəffaf məhluldur.

Farmakoterapevtik qrupu

Digər hematoloji vasitələr.

ATC kodu: B06AB.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Aktivogen oksigen və qlükozanın absorbsiyasını və istifadəsini artırır; inozitolun əmələ gəlməsində iştirak edən fosforlaşmış oliqosaxaridlər qlükozanın istifadəsinə və daşınmasına müsbət təsir göstərir, bu isə hüceyrə metabolizminin yaxşılaşmasına və işemiya zamanı laktat əmələ gəlməsinin azalmasına səbəb olur.

Preparatın neyroprotektiv təsiri bir neçə mexanizmlə izah olunur.

Farmakokinetikası

Aktivogenin farmakokinetik xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün farmakokinetik üsullar tətbiq edilə bilməz, çünki preparat yalnız orqanizmdə təbii mövcud olan fizioloji komponentlərdən ibarətdir.

İstifadəsinə göstərişlər

Aktivogen inyeksiyası aşağıdakı hallarda göstərişdir:

Baş beynin metabolik və damar pozğunluqları (işemik insult, beynin travmatik zədələnmələri).

Periferik qan dövranı pozğunluqlarının və onlarla əlaqəli ağırlaşmaların simptomatik müalicəsi.

Əks göstərişlər

Aktivogen inyeksiyasına və analoji preparatlara və ya onların tərkibindəki köməkçi maddələrə qarşı yüksək həssaslıq;

Ağır böyrək çatışmazlığı.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Allergik reaksiyalar (məsələn, səpgi) baş verərsə, preparatın qəbulunu dərhal dayandırın.

Digər infuziya preparatları ilə qarışdırmayın.

Əzələdaxili istifadə zamanı 5 ml-dən çox olmayaraq, yavaş yeridilir.

Venadaxili istifadə zamanı infuziya sürətinin 2 ml/dəq-dən aşağı olması tövsiyə olunur.

Məhsulun xüsusiyyətləri dəyişmişdirsə, istifadə etməyin.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsir araşdırmaları aparılmamışdır.

Uyuşmazlığı

Aktivogen inyeksiyasını digər dərman vasitələri ilə qarışdırmaq olmaz.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Məhsul hamiləlik və laktasiya dövründə istifadə edilməməlidir.

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Müalicə dövründə nəqliyyat idarə etməkdən və yüksək diqqət və sürətli psixomotor reaksiyalar tələb edən digər potensial təhlükəli fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaqdan çəkinmək lazımdır.

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri məlum deyil.

İstifadə qaydası və dozası

Venadaxili infuziya

Dozalanma

İnsult və beynin travmatik zədələnmələrinin müalicəsi üçün 20-30 ml Aktivogen inyeksiya üçün 250 ml 5%-li qlükoza məhlulu və ya inyeksiya üçün 0,9%-li natrium xlorid məhlulu ilə durulaşdırılır. Sürəti 2 ml/dəq-dən yuxarı olmayaraq, yavaş infuziya şəklində gündə bir dəfə, 2 həftə ərzində tətbiq edilir.

Beyin funksiyalarının pozğunluqları və demensiyanın müalicəsində 30 ml Aktivogen inyeksiya üçün 250 ml 5%-li qlükoza məhlulu və ya inyeksiya üçün 0,9%-li natrium xlorid məhlulu ilə durulaşdırılır. Yavaş infuziya şəklində, gündə bir dəfə, 2 həftə ərzində tətbiq edilir.

İstifadə qaydası

İnsult və beynin travmatik zədələnmələrinin müalicəsi üçün 20-30 ml Aktivogen inyeksiya üçün 250 ml 5%-li qlükoza məhlulu və ya inyeksiya üçün 0,9%-li natrium xlorid məhlulu ilə durulaşdırılır. Sürəti 2 ml/dəq-dən yuxarı olmayaraq, yavaş infuziya şəklində gündə bir dəfə, 2 həftə ərzində tətbiq edilir.

Beyin funksiyalarının pozğunluqları və demensiyanın müalicəsi üçün 30 ml Aktivogen inyeksiya üçün 250 ml 5%-li qlükoza məhlulu və ya inyeksiya üçün 0,9%-li natrium xlorid məhlulu ilə durulaşdırılır. Yavaş infuziya.

Əzələdaxili inyeksiya.

Dozalanma

Əzələdaxilinə istifadə zamanı 5 ml-dən çox olmayaraq, yavaş yeridilir.

Əlavə təsirləri

Əlavə təsirlərin tezliyi aşağıdakı parametrlərlə təyin edilir: çox tez-tez ($\geq 1/10$); tez-tez ($\geq 1/100$ - $< 1/10$); bəzən ($\geq 1/1000$ - $< 1/100$); nadir hallarda ($\geq 1/10000$ - $< 1/1000$); çox nadir hallarda ($< 1/10000$); məlum deyil (əldə olan məlumatlara görə tezliyi qiymətləndirmək mümkün deyil).

Allergik reaksiyalar: dəri səpgisi, dəridə hiperemiya, hipertermiya, anafilaktik şoka qədər.

Pediatrik pasiyentlərdə istifadəsi

Preparatın pediatriyada istifadəsinə dair araşdırmalar aparılmamışdır və istinad ədəbiyyatı yoxdur.

Yaşlılarda istifadəsi

Yaşlı pasiyentlərdə preparatın istifadəsinə dair araşdırmalar aparılmamışdır və istinad ədəbiyyatı yoxdur.

Doza həddinin aşılması

Preparatın doza həddinin aşılması haqda məlumat yoxdur.

Buraxılış forması

5 ml məhlul, şüşə ampulda. 5 ampul, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C temperaturdan yüksək olmayan, sərin və qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

Tonghua Huikang Biological Pharmaceutical Co., Ltd., China.

No. 10 Yongkang road, Chaoyang town, Huinan county, Jilin province, China.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

BIH Pharmaceuticals Ltd., Bulgaria.

Sofia – 1404 Triadica district, Kostenski Vodopad str.45/V/3., Bulgaria.