

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Surasının sədri



F. M. Ağayev

2022-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

TRIMEQASTİN təsiredici maddəsi tədricən azad olan örtüklü tabletlər
TRIMEGASTİN

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Trimebutine maleate

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 300 mq trimebutin maleat vardır.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, çaxır turşusu, polividon, hipromelloza, susuz koloidal silisium, maqnezium stearat, titan dioksid E171, makroqol 6000.

Təsviri

Dairəvi, ağ rəngli, iki tərəfi qabarıq, hamar səthli örtüklü tabletlərdir.

Farmakoterapevtik qrupu

Miotrop spazmolitik.

ATC kodu: A03AA05.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Trimebutin bağırsaq peristaltikasını tənzimləyir.

Xüsusilə, atoniya hallarında bağırsaq peristaltikasını stimullaşdırır və bağırsaq stimulyasiyasından sonra bağırsaq peristaltikasının artmasının qarşısını alır.

Beləliklə, bağırsaq motorikasının tənzimlənməsi ilə onun normal fəaliyyəti təmin olunur.

Trimebutinin təsiri yalnız endogen opioid reseptorlarına aid edilən periferik enkefalin reseptorlarının stimullaşdırılması ilə əldə olunur.

Bundan başqa, trimebutin spazmolitik və yerli ağrıkəsici təsir göstərir.

Farmakokinetikası

Trimebutin tez sorulur. İlk keçid metabolizminə məruz qalır.

Biomənimsənilmə 5% təşkil edir.

Trimebutin və onun metabolitləri sürətlə əsasən böyrəklər vasitəsilə xaric olur.

24 saat ərzində dozanın 70%-i xaric olur.

İstifadəsinə göstərişlər

Mədə-bağırsaq traktının funksional pozğunluqlarının simptomatik müalicəsi.

Əks göstərişlər

Preparatın tərkibindəki hər hansı maddələrə qarşı yüksək həssaslıq.

Laktoza çatışmazlığı, galaktoza-qlükoza malabsorbsiyası olan xəstələr.

TRIMEQASTİN ağır böyrək çatışmazlığı hallarında əks göstərişdir.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

TRIMEQASTİN ilə müalicəyə başlamazdan əvvəl mövcud həzm sistemi xəstəliyi ehtimalı istisna edilməlidir (məsələn, iltihablı enteropatiya, mexaniki obstruksiya və s.).

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Məlum deyil.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Heyvanlar üzərində aparılan təcrübələr zamanı heç bir teratogen təsir müəyyən olunmamışdır. Beləki, hamiləlik və laktasiya dövründə istifadənin təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir araşdırma olmadığından, bu dövrlərdə tətbiq edilməməlidir.

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Normal şərtlərdə heç bir təsiri yoxdur.

İstifadə qaydası və dozası

Böyüklərdə - 6 gün ərzində zərbə dozası: gündə 2 tablet, 1 tablet səhər və 1 tablet axşam təyin olunur.

Saxlayıcı doza: gündə 1 tablet 20 gün ərzində təyin olunur.

TRIMEQASTİN qida qəbulu arası təyin olunur.

Əlavə təsirləri

Əlavə təsirlərin tezliyi aşağıdakı parametrlərlə təyin edilir: çox tez-tez ($\geq 1/10$); tez-tez ($\geq 1/100 - < 1/10$); bəzən ($\geq 1/1000 - < 1/100$); nadir hallarda ($\geq 1/10000 - < 1/1000$); çox nadir hallarda ($< 1/10000$); məlum deyil (əldə olan məlumatlar görə tezliyi qiymətləndirmək mümkün deyil).

Çox nadir hallarda başgicəllənmə, yuxululuq və dəri reaksiyaları bildirilmişdir.

Doza həddinin aşılması

Həddindən artıq preparatın istifadəsinə görə intoksikasiya hallarında müalicə simptomatikdir.

Buraxılış forması

10 tablet PVC/PVDC alüminium blisterdə. 2 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C temperaturdan yüksək olmayan, rütubətdən qorumaqla və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

GALENICA PHARMACEUTICAL INDUSTRY S.A.

3rd km Old National Road Chalkida-Athens, Glifa, Chalkida, Eubia, 34100 Yunanıstan.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

GALENICA S.A., 4 Eleftherias str. 145 64 Kifiissia, Yunanıstan.