



Bottle of 10 ml e



Hyaluronic Acid and Citicoline

Composition:

Composition:
Hyaluronic acid, Citicoline monosodium salt, Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, Sodium chloride, Benzalkonium chloride, Water for Injection

What QMK1® looks like

OMK1® is a sterile ophthalmic solution in a bottle of 10 ml

What it is

What it is

OMK1® is an ophthalmic solution containing high molecular weight Hyaluronic acid 0,2% and Citicoline 2%. Hyaluronic acid is obtained by biotechnological synthesis and gives rise to mucomimetic, mucoadhesive and viscoelastic solutions, useful to improve tear film stability and thus to maintain ocular surface lubricated, hydrated and protected. Furthermore, solutions containing Hyaluronic acid are able to establish a favorable microenvironment for repair processes of the ocular surface in cases of damage on corneal and conjunctival epithelia.

Finally, OMK1®, thanks to the presence of Citicoline, gives a useful and beneficial structural support in restoring the integrity of cell membranes damaged by degenerative eye pathologies, as Glaucoma.

When OMK1® should be used

The wetting and protective properties of the product ensure ocular relief in case of irritation, burning and foreign body sensation caused by environmental factors as wind, sun, dry air, salt water, smoke, bright light, air conditioning, heating, prolonged use of video terminals or eye surgery, conjunctivitis or use of contact lenses.

In addition, OMK1[®], thanks to the presence of Citicoline and to its structural action on retinal ganglion cells, is indicated as coadjuvant to antihypertensive therapy in Glaucomatous patients.

How much and how to use

1 drop 3 times daily, as needed.

Precautions and warnings

- Do not use if the bottle is damaged.
- Do not use in case of incompatibility to any preparation component.
- Do not use after the expiry date printed on the pack.
- Avoid contact of the tube-tip with the eye.
- A temporary blurring of vision may occur after its administration. It is suggested to wait a few seconds before starting any activity which requires visual clarity.
- Wait 10-15 minutes after its use before instilling ophthalmic medicinal product for topical use.
- The product shall be used within 30 days after first opening.
- Keep the product out of the reach and sight of children.
- The product is only for external ophthalmic use.
- Do not store above 25°C.
- Do not disperse the bottle after the use.

Manufacturer:

Omikron Italia S.r.l. - Via Flaminia Nuova, 1068 - 00189 Rome - Italy

Date of last revision: March 2025

Date of last revision: March 2020

Hialuron turşusu və sitikolin

Tərkibi

Hialuron turşusu, sitikolin natrium duzu, natrium fosfat monohidrat, natrium dihidrofosfat dodekahidrat, natrium xlorid, benzalkonium xlorid, ineksiya üçün su.

OMK1 -in təsviri

OMK1 – 10 ml-lik flakonlara gəbləşdirilmiş, steril oftalmoloji məhluldur.

Omk 1 n  dir?

Omk 1 oftalmoloji məhlulu biotexnologiyası sintez vasitəsilə əldə edilmiş yüksək molekulyar çəkiyə malik olan 0,2%-li hialuron turşusu və 2%-li sitikolindən ibarətdir. Hialuron turşusu göz yaşı təbəqəsinin sabitliyini yaxşılaşdırmağa yardım edən mukomimetik, mukoadgeziv və özlü-elastik məhlullara əlavə edilir ki, göz yaşı təbəqəsini nəmləndirsin və qorusun. Bundan başqa, tərkibində hialuron turşusu olan məhlullar buynuz qişanın və konyuktiva epitelinin zədələndiyində, göz səthini bərpa etmək üçün əlverişli mikromühit yaratmağa qadirdirlər. Omk1-in tərkibində olan sitikolin, degenerativ göz patologiyaları (məsələn, glaukoma) nəticəsində zədələnmiş hüceyrə membranlarının təmliyinə bərpasında əhəmiyyətli rol oynayıv.

Nə zaman istifadə olunur

Gözdə müxtəlif ekoloji faktorların təsirindən (kulək, günəş, quru hava, duzlu su, tüstü, intensiv işıq, kondisioner) və göz əməliyyatlarından sonra və ya kontakt linza istifadəsi nəticəsində gözdə yaranmış qıcıqlanma, yağı, yad cisim olma hissiyatı zamanı gözün buynuz qıçasını nəmləndirmək və fizioloji riepializasiyasını bərpa etmək məqsədilə istifadə olunur. Bundan başqa OMK1-in tərkibindəki sitikolin torlu qıdadaki qanqlioz hüceyrələrə struktur təsir etdiyindən glaukoma zamanı antihi-pertenziyada kompleks müalicədə istifadə olunur.

Dozalanma və istifadə qaydası

Ehtiyac olduqda, gündə 3 dəfə 1 damcı gözə damızdırılır.

Ehtiyat tədbirləri

- Flakon zədələnməmiş, məhluldan istifadə etmək olmaz.
- Preparatın istənilən komponentinə qarşı dözümsüzlük olduqda, məhluldan istifadə etmək olmaz.
- Flakonun ucunu göz səthinə toxundurmaq olmaz.
- İstifadə etdikdən sonra müvəqqəti olaraq görmənin dumanlanması müşahidə edilə bilər.
- Bu səbəbdən, aydın görmə tələb edən istənilən işə başlamazdan əvvəl bir neçə saniyə gözləmək məsləhət görülür.
- Bu məhsuldan istifadə etdikdən sonra 10-15 dəqiqə gözləmək lazımdır. Bu müddət keçdikdən sonra digər yerli istifadə üçün nəzərdə tutulmuş oftalmoloji vasitələrdən istifadə etmək olar.
- Bu məhlul ilk açıldıqdan sonra yalnız 30 gün ərzində istifadə edilə bilər.
- Yalnız oftalmologiyada, xaricə istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Saxlanılma şəraiti

25 °C- dən aşağı temperaturda saxlanılmalıdır.

Usaqların əlləri catan yerlərdən uzaqda saxlamaq lazımdır.

		 Phone contact: +39 06 87934270 e-mail contact: artwork@grafimed.it www.grafimed.it	
Old Item Code:	n/a	Customer:	Omikron
New Item Code:	912711/03	Printing Colours:	Black
Country:	EN/AZ/RU		
Product Name:	OMK1 Cis	Technical Colours:	Diecut
Measures:	135 x 425 mm	Tags and Categories:	MD MDD CT MED.DEV
Fold:	135 x 28 mm		
Material:	Carta		
Grammage:	50 gr		
Laetus Code:	X X X I X X I I X I I (3939)	Notes:	
Edge Marks:	n/a	Codice Laetus:	I 0,35x6mm X 1x6 mm H 0,65 mm
Min. Text Size:	n/a		
Draft:	1 29.04.2026		
Pag. 1/2			

Yararlılıq müddəti

Qablaşmanın üzərində qeyd edilən yararlılıq müddəti bitdikdən sonra preparatı istifadə etmək olmaz.

İstehsalçı

Omikron Italia S.r.L. – Via Flaminia Nuova, 1068 - 00189 Roma, İtaliya

Dəyişikliklərin edilməsinin son tarixi
Mart, 2025

Avropa patent no Ep2538918

Amerika Birləşmiş Ştatları patent no US8822429

Инструкция
по применению изделия медицинского
назначения для потребителя

Название изделия медицинского назначения

Омк 1 капли глазные стерильные, 10 мл.

Состав и описание изделия:

Прозрачный, бесцветный раствор.
Состав капель: гиалуроновая кислота 0,2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций.
Омк 1 является офтальмологическим раствором, содержащим 0,2 % гиалуроновой кислоты с высокой молекулярной массой, полученной путем биотехнологического синтеза и цитиколина 2%. Г иалуроновая кислота повышает мукомиметические, мукоадгезивные и вязкоэластичные свойства растворов, полезные для улучшения стабильности слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненной и защищенной. Кроме того, растворы, содержащие гиалуроновую кислоту способны создавать благоприятную микросреду для восстановления глазной поверхности в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы эпителия. Наличие цитиколина в Омк 1 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных глазных патологий, таких как глаукома.

Область применения:

Область применения: местное применение в офтальмологии

Назначение:

Увлажняющие и защитные свойства препарата обеспечивают облегчение в случае раздражения, жжения и ощущения инородного тела, вызванного экологическими факторами, такими как ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, яркий свет, кондиционер, отопление, длительное использование маниторов, хирургия глаза, конъюнктивит или использование контактных линз.
ОМК1, благодаря наличию цитиколина, и его структурного воздействия на ганглиозные клетки сетчатки, назначается как вспомогательное при антигипертензивной терапии у больных глаукомой.

Способ применения:

По 1 капле 3 раза в день по мере необходимости.

Условия хранения:

При температуре не выше 25 °C.

Срок годности

3 года.
Не более 30 дней после вскрытия упаковки.
Не применять после истечения срока годности!

Стерильно

Производитель:

Omikron Italia S.r.l., Италия Вия Фламиния Нуова, 1068, 00189 Рим (Италия).

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым
произведено изделие медицинского назначения

Директива Совета Европы 93/42/ЕЭС по медицинским приборам

Побочное действие:

Временная нечеткость зрения может наблюдаться после введения.
Рекомендуется подождать несколько секунд, прежде чем начинать любую деятельность, требующую четкость зрения.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Меры предосторожности:

- Не использовать в случае повреждения упаковки.
- Не использовать в случае непереносимости любого компонента препарата.
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Избегать контакта капельницы с поверхностью глаза.
- Необходимо подождать 10-15 мин после использования капель перед применением других офтальмологических средств для местного применения.
- Использовать не более 30 дней после вскрытия упаковки.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Только для внешнего применения в офтальмологии.

Дата последнего пересмотра: март 2025 года



Omikron Italia s.r.l. - Via Flaminia Nuova, 1068 - 00189 Roma

BACK

		 ARTWORK PROVIDER		Phone contact: +39 06 87934270 e-mail contact: artwork@grafimed.it www.grafimed.it			
Old Item Code:		n/a		Customer:		Omikron	
New Item Code:		912711/03		Printing Colours:		Black	
Country:		EN/AZ/RU					
Product Name:		OMK1 Cis		Technical Colours:		Diecut	
Measures:		135 x 425 mm		Tags and Categories:		MD MDD	
Fold:		135 x 28 mm				CT	
Material:		Carta				MED.DEV	
Grammage:		50 gr					
Laetus Code:		X X X I X X I I X I I (3939)		Notes:			
Edge Marks:		n/a		Codice Laetus:		I 0,35x6mm	
Min. Text Size:		n/a				X 1x6 mm	
Draft:		1 29.04.2026				H 0.65 mm	
Pag. 2/2							