

navitae[®] PLUS

EYE DROPS

Antioxidant and lubricant ophthalmic solution
with sodium hyaluronate, vitamin A & vitamin E

NOVAX[®]
PHARMA



COMPOSITION:

Sodium Hyaluronate 0,15%, Carboxymethyl Beta-Glucan, Vitamin A Palmitate, Vitamin E TPGS, SCO[®] in an isotonic solution buffered pH 7,0.

DESCRIPTION:

NAVITAE[®]PLUS contains polysaccharidic lubricants such as **Sodium Hyaluronate** and **Carboxymethyl Beta-glucan**, and a protective lubricant lipophilic system composed of **Vitamin A** and pegylated **Vitamin E**. The topical ocular use of **Vitamin A** improves contact lens wearing by reducing the frictional, mechanical damage that they can cause on epithelial cells of the cornea and conjunctiva.

Vitamin A stabilizes the fatty phase of the lachrymal film by increasing its capacity to maintain natural hydration, therefore reducing the symptoms of ocular dryness. This activity is also exerted by the polysaccharides present in the product.

Vitamin E is an antioxidant that helps to reduce the concentration of free radicals in the lachrymal fluid, and therefore enhances the protection of corneal and conjunctival epithelial cells, decreasing the risk of inflammation.

NAVITAE[®]PLUS is preserved with a special preservative system called **SCO[®]** (Stabilized Complex Oxychloro) that keeps the solution sterile in the bottle. When exposed to light, **SCO[®]** dissipates into components naturally found in the human tears such as sodium chloride, oxygen and water, making it very well tolerated.

INDICATIONS:

NAVITAE[®]PLUS is a lubricant ophthalmic solution with an antioxidant and moisturizing effect used for the relief of dry eyes and ocular discomfort caused by:

- Ocular irritation caused by pathologies such as keratitis, adverse effects following corneal surgery, traumatic ulcers, corneal inflammation.
- Oxidative stress due to light exposure and/or an increase in free radicals on the ocular surface.
- Contact lens wearing.

NAVITAE[®]PLUS is compatible with all types of contact lenses.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Wash, rinse and dry your hands thoroughly.
- Make sure the seal is intact.
- To open the bottle, unscrew the top completely to break the safety seal.
- Instill 1 or 2 drops into each eye, 3 to 6 times a day, or according to the specialist's advice.
- Close the bottle tightly after use.

WARNINGS:

- To prevent possible contamination, do not let the tip of the dropper come into contact with any surface or the eye.
- Do not use in case of specific hypersensitivity towards any of the constituents.
- In some cases, slight sensitivity may cause a brief stinging or irritation upon instillation that disappears after blinking.
- If the ocular irritation persists and you experience pain, redness or change in vision following the instillation, consult your specialist.
- Do not swallow the solution.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Do not use the solution after the expiry date.
- After the bottle has been opened, the solution must be used within 90 days.
- Do not use if the bottle is damaged.
- **Do not expose to direct sunlight.**

STORAGE:

- Store between 5 and 35°C and protect from a direct source of light.


3 ml (free sample)

REF D3NP126

15 ml

REF D15NP127

STERILE | A



Distributor in Azerbaijan and Georgia:

BIH Pharmaceuticals Ltd

Sofia - 1404, Triadica district,
Kostenski Vodopad str.45/V/3, BULGARIA

NOVAX[®]PHARMA

Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V4 - Rev. 06/07/2018

GÖZ DAMCISI

Natrium hialuronat, A və E vitamini tərkibli antioksidant və lyubrikant oftalmoloji məhlul.
Tibbi vasitə.



TƏRKİBİ:

pH 7,0 izotonik bufer məhlulunda 0,15%-li natrium hialuronat, karboksimetil beta-qlükən, vitamin A palmitat, **vitamin E TPGS, SCO[®]**.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

NAVITAE[®]PLUS –ün tərkibinə **natrium hialuronat** və **karboksimetil beta-qlükən** kimi polisaxaridlər, həmçinin A və E vitaminlərinin lipofil birləşmələrindən ibarət lyubrikantlar daxildir.

A vitaminin yerli təbiiq zamanı buynuz qişanın və konyuktivanın epitelial hüceyrələrinin mexaniki zədələnməsi azaldaraq kontakt linzaların istifadəsini yaxşılaşdırır.

A vitamini göz yaş pərdəsinin lipid təbəqəsini stabilizə edərək gözün təbii nəmliyini dəstəkləyir, bununla da gözdə quruluq əlamətlərini azaldır. Məhsulun tərkibində olan polisaxaridlər də bu təsira malikdir.

E vitamini göz yaş mayesinde sərbəst radikalların konsentrasiyasının azalmasını əhəmiyyətli dərəcədə təmin edən antioksidant olub, konyuktiva və buynuz qişanın epitelial hüceyrələrinin müdafiəsini gücləndirir, iltihab riskini azaldır.

NAVITAE[®]PLUS–ün tərkibində məhlulu flakonda steril saxlayan xüsusi **SCO[®]** (Stabilized Complex Oxychloro) birləşməsi vardır. Işıqın təsirindən **SCO[®]** natrium xlorid, oksigen və su kimi insanın göz yaşında mövcud olan təbii komponentlərə parçalanır. Bu da məhsulun xəstələr tərəfindən yaxşı keçirilməsini təmin edir.

İSTİFADƏSİ:

NAVITAE[®]PLUS antioksidant və nəmləndirici təsira malik oftalmoloji lyubrikant məhlul olub, aşağıdakı halların səbəb olduğu quru göz sindromunu və gözdə olan diskomfort hissini aradan qaldırır.

- Keratit kimi patologiyaların səbəb olduğu gözdə qıcıqlanma, buynuz qişanın cərrahi əməliyyatından sonra müşahidə olunan əlavə təsirlər, travmatik xoralar, buynuz qişanın iltihabı.
- Işıqın təsirindən və/və ya göz səthində sərbəst radikalların artması nəticəsində oksidativ stress zamanı.
- Kontakt linzaların istifadəsi.

NAVITAE[®]PLUS kontakt linzaların bütün növləri ilə uyğunlaşır.

İSTİFADƏ QAYDASI:

- Öncə əlləri təmiz yumaq və qurulamaq lazımdır.
- Əmin olmaq lazımdır ki, flakonun qoruyucu halqası zədələnməyib.
- Flakonu açmaq üçün başlığını tam fırladaraq qapaqın qoruyucu halqasını qırmaq lazımdır.

- Həkimin məsləhətinə uyğun olaraq və yaxud gündə 3-6 dəfə hər gözə 1-2 damcı damcılatmaq lazımdır.
- İstifadədən sonra flakonu kip bağlamaq lazımdır.

EHYİYAT TƏDBİRLƏRİ:

- Cırlənmə ehtimalının qarşısını almaq üçün damcıtokeanın ucunun hər hansı səthə və ya gözə təmas etməsindən qaçınmaq lazımdır.
- Tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq olarsa məhsuldan istifadə etmək olmaz.
- Bəzən zəif dərəcədə həssaslığın artması göz qırpmadan sonra keçən qısamüddətli yangı hissi və yaxud instillyasiya zamanı qıcıqlanmanın yaranmasına səbəb ola bilər.
- Əgər gözə qıcıqlanma davam edərsə və instillyasiyadan sonra ağrı, qızartı və ya görmənin pozğunluğu müşahidə olunarsa, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.
- Məhlulu udmaq olmaz.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.
- Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra məhsuldan istifadə etmək olmaz.
- Flakonu açdıqdan sonra məhlulu 90 gün ərzində istifadə etmək lazımdır.
- Flakon zədələnməmişdirsə məhsuldan istifadə etmək olmaz.
- Birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq lazımdır.
- Bu məhsul dərman vasitəsi deyil.

SAXLANMA SƏRAİTİ:

- 5-35°C temperaturda, birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorunan yerdə saxlamaq lazımdır.

3 ml (pulsuz nümunə)

REF D3NP126

15 ml

REF D15NP127

STERILE | A



Azərbaycan və Gürcistan'daki distribütör:

BIH Pharmaceuticals Ltd

Sofia - 1404, Triadica district,

Kostenski Vodopad str.45/V/3, BULGARIA

NOVAX[®] PHARMA

Le Coronado

20, Avenue de Fontvieille

MC 98000 - MONAKO

www.novaxpharma.com

V4 - Rev. 06/07/2018

